

Ueber die Stenose und Obliteration der Aorta in der Gegend
der Insertion des Ductus arteriosus Botalli.

Inaugural-Dissertation

welche mit Genehmigung
der

medizinischen Facultät der Universität Breslau

zur Erlangung der Doctorwürde
in der

Medicin und Chirurgie

Sonnabend, den 14. Juni 1884, Mittags 12 Uhr

in der Aula Leopoldina

öffentlich vertheidigen wird

Isidor Manneberg,

pract. Arzt.

Opponenten:

Max Salomon, I. Volont.-Arzt der Provinzial-Irrenanstalt zu Leubus.

Drd. med. **Ernst Epstein**, pract. Arzt.

Breslau,

Buchdruckerei H. Proskauer jr.

Neudorfstrasse 11b.

Seinem hochverehrten Lehrer

Herrn Professor

Dr. Emil Ponfick

Director des pathologischen Instituts

in Hochachtung und Dankbarkeit

sowie

Seinen theuren Eltern

in kindlicher Liebe

gewidmet

vom Verfasser.

Die Verengerungen der Aorta in der Gegend der Einsenkung des Ductus arteriosus Botalli sind wegen ihres innigen ursächlichen Zusammenhanges mit den foetalen Kreislaufverhältnissen als eine besondere Gruppe von den übrigen Verengerungen dieses grossen Gefässstammes wohl abzuscheiden. Diesen Zusammenhang vermuthend haben bereits die ältesten Beobachter der in Rede stehenden Anomalie, wie Reynaud, Bouillaud, Cruveilhier, Otto, Craigie, dieselbe mit der Involution des Ductus arteriosus Botalli in Verbindung gebracht. Andere dagegen, wie Graham, Alexander Meckel, Herrmann, Roemer und Allen voran Tiedemann (Friedrich T., von der Verengerung und Schliessung der Pulsadern, Heidelberg u. Leipzig 1843), haben sich absolut dagegen verwahren zu müssen geglaubt, dass die Obliteration der Aorta an besagter Stelle als ein ursprünglicher Bildungsfehler anzusehen sei. Nach ihrer Ansicht ist die Ursache der Stenose oder Obliteration Erkrankung der Aortenintima. Zu Gunsten dieser Behauptung führt Tiedemann (l. c. p. 143) an, dass in mehreren Fällen die intima der Aorta geröthet, verdickt und mit Gerinnseln bedeckt, sowie auch die Herzklappen erkrankt

gefunden seien, — Erscheinungen, die wir heute nicht als Ursache, sondern als Folge der Aortenstenose ansehen.

Die Annahme Chever's (Arch. génér. de méd. 4 serie. 1845 T. 9. p. 350), dass die Obliteration des Ductus arteriosus Botalli durch Anspannung des linken nervus laryngeus inferior bei der mit dem ersten Athemzuge verbundenen Hebung des Kehlkopfs herbeigeführt werde, und dass in Fällen zu starker Anspannung auch die Aorta comprimirt und zur Stenose oder Obliteration gebracht würde, kann ebenso fallen gelassen werden, wie die Ansicht Ving'ss (London, Medical Gazette, Vol. 26 p. 622), welcher die Entstehung der Stenose der Ausdehnung des linken Bronchus zuschreibt.

Der Erste, welcher eine beachtenswerthe Erklärung für die vorliegende Missbildung gab, war Bochdalek. Dieser beschrieb (Vierteljahrsschrift für die praktische Heilkunde. Prag 1845 Bd. 4. p. 160 ff.) einen Fall von Ektasie und Thrombose des Ductus arteriosus Botalli bei einem 22tägigen mit Hasenscharte und Wolfsrachen behafteten Knaben, wo ein aus dem thrombosirten Ductus fortgeleitetes Gerinnsel die Aorta obturirte und so zur Todesursache wurde. Nach Bochdalek beweist dieser Fall, „dass die Obliteration oder Verengung der Aorta im Bereiche des Ductus arteriosus Botalli wohl immer während der Verwachsung (Involution) desselben und zwar nur dann entstehe, wenn dieselbe nicht wie gewöhnlich durch blosse Auflockerung, Wulstung und endliche Schrumpfung geschieht, sondern wenn die Verwachsung des Botallischen Ganges durch einen höheren Grad von Entzündung und Ablagerung von plastischem, mehr oder weniger derbem Exsudate in seinen Canal und Organisation desselben zu Stande komme. Aber selbst in letzterem Falle

kann sich nur dann eine Obliteration oder Verengung der Aorta bilden, wenn die von plastischem Exsudate begleitete Entzündung des Ductus arteriosus die Grenze desselben überschritten, sich bis in die Aorta fortgepflanzt und in jener Gegend einen plastischen Lymphpfropf abgesetzt hat, wodurch der Canal der Aorta entweder ganz obturirt, oder wenn das Exsudat nur eine mehr oder weniger dicke Lage am innern Umfange der Aorta gebildet und in der Mitte hohl geblieben ist, wenigstens eine Verengung hervorgebracht hat.“ Zwei ähnliche Fälle, wie den Bochdalek'schen, erklärt Rauchfuss (Virchow, Archiv für patholog. Anatom. und Physiol. Bd. 18) gesehen zu haben, ohne dass sich derselbe der Bochdalek'schen Erklärung anschliesst. In der Rauchfuss'schen Arbeit „Ueber Thrombose des Ductus arteriosus“ (Virchow, Archiv Bd. 17 p. 376) sind diese beiden Fälle veröffentlicht. Der eine Fall betrifft ein zwei Wochen altes Mädchen, bei dem sich ein Thrombus aus dem Ductus arteriosus einerseits in die Lungenäste andererseits in das Aortenbogenende fortsetzte und dessen Lumen um $\frac{2}{3}$ verengte. Der zweite Fall handelt von einem zehn Tage alten Mädchen, bei dem von dem ebenfalls ektasirten und thrombosirten Botallischen Gang ein sehr frisches fadenförmiges Gerinnsel in das Lumen der Aorta sich hineinerstreckte. Endlich beschreibt Virchow (Thrombosen der Neugeborenen, citirt von Rauchfuss) einen Fall von Hineinragen des spitzen Endes des Thrombus aus dem Ductus arteriosus in die Aorta und weist darauf hin, dass in manchen Fällen von Obliteration der Aorta an der Insertionsstelle des Ductus arteriosus der Vorgang der Verödung auf fortgesetzte obturirende Thrombose dieses Aortaabschnittes, welche von primärer Thrombose und Ektasie des arteriösen Ganges ausgegangen,

zurückführbar sei. Diese Ansicht Virchow's kann man, zumal angesichts des Bochdalek'schen Falles, wohl gelten lassen. Bochdalek selbst ging aber zu weit, wenn er alle Fälle von Obliteration und Stenose an der Insertionsstelle des Ductus arteriosus auf diese Weise entstehen liess. Denn einmal geht die Involution des Botallischen Ganges nur in den seltensten Fällen auf dem Wege der Thrombose oder Exsudatbildung vor sich; dann sind aber Fälle beobachtet worden, namentlich der instructive Fall von Rauchfuss (Virchow, Archiv Bd. 18 p. 544) bei einem 3 Wochen altem Kinde, in denen bei vollständigem Offenbleiben des Ductus arteriosus, also bei Fehlen eines jeden Involutionsvorganges doch eine Stenose der Aorta an der Insertionsstelle des Ganges vorhanden war.

Auch Langer (Zur Anatomie der foetalen Kreislauforgane. Zeitschrift der Gesellschaft der Aerzte zu Wien. 13. Jahrgang 1857. p. 328 ff.) versucht die Stenose und Obliteration der Aorta in der Gegend der Insertion des Ductus arteriosus mit der Involution dieses Ganges in Zusammenhang zu bringen. Nach seinen Untersuchungen hat der Ductus arteriosus Botalli bereits im 5. Monat des Foetal-lebens einen von der Arteria pulmonalis und der Aorta abweichenden Bau. Er zeichnet sich aus durch den Mangel von elastischen Fasern in der mittleren Gefässhaut; seine Wandung ist aber stärker als die der Arteria pulmonalis und Aorta theils durch Entwicklung zahlreicher die Tunica media längs durchsetzender Kernstränge innerhalb ebensolcher circulärer, theils durch eine mächtige Kernwucherung an der innern Oberfläche des Ganges. Träger dieser Kerne sind kurze Spindelzellen. Durch Zunahme dieser Kernbildungen in den ersten Lebenstagen kommt es zu einer immer grösseren

Wanddicke bei gleichzeitiger Abnahme des Lumens. Endlich schliesst sich der Gang zuerst in seiner Mitte und später fortschreitend nach oben und unten. Durch Entwicklung von Bindegewebe aus den oben erwähnten Kernsträngen kommt es zur Schrumpfung des Ganges nach Art des Narbengewebes.* Langer sagt alsdann: „Möglich, dass die Fälle von angeborener Verengerung der Aorta, die constant hier vorkommen, darin ihren Grund haben, dass sowie der Bogen der rechten embryonalen Aorta (Duct. arter. Bot.) auch der der linken blos aus Bindegewebe besteht und nach der Geburt trotz den einem solchen Processe höchst ungünstigen mechanischen Verhältnissen auch auf die besprochene Weise der Verödung zugeführt wird.“ Auf diese Ansicht komme ich später noch einmal zurück.

Hamernjk (Vierteljahrsschrift für die pract. Heilk. Prag u. Leipzig. 1844. Bd. I, 1. p. 41 ff. u. 1848 Bd. V, 4. p. 40. ff.), dessen erste Arbeit über diesen Gegenstand vor der bereits erwähnten Bochdalek'schen erschien, theilte die Stenosen und Obliterationen der Aorta in drei Gruppen, je nachdem sie oberhalb, an oder unterhalb der Insertionsstelle des Ductus arteriosus Botalli sich befinden. Er erklärte diese drei Arten als auf verschiedene Weise entstanden. Nach ihm ist die unterhalb der Insertion des Ductus arteriosus Botalli auftretende Stenose durch Fortsetzung eines Thrombus aus diesem Gange in die absteigende Aorta und Schrumpfung dieses Thrombus zu Stande gekommen. Das Unrichtige dieser Erklärung ist schon oben nachgewiesen. Die Stenose an der Insertionsstelle des Ductus erklärt Hamernjk durch Auftreten angeborener Scheiden inner-

* Derselbe Vorgang lässt sich nach Langer in den Nabelarterien nachweisen, soweit sie der spätern Obliteration anheimfallen.

halb der Aorta, und nur für die Stenose oberhalb der Insertionsstelle des Ductus giebt er eine Hemmungsbildung, die Persistenz des sogenannten Isthmus Aortae an. Die Stenose könne sich durch Entwicklung eines Collateralkreislaufes bis zur Obliteration steigern.

Aus der Embryologie wissen wir, dass sich die Lungenarterie aus den hintersten (fünften) primitiven Aorten vorzugsweise der linken, entwickelt und nach Abgabe der Lungenäste in die spätere Aorta descendens umbeugt, sodass die Aorta descendens als Fortsetzung der Pulmonalarterie erscheint, während die eigentliche Aorta nur ein für den Kopf und die obern Extremitäten bestimmtes Gefäss darstellt, das direct in die linke Arteria subclavia ausläuft und durch ein nur enges Gefässstück, Isthmus Aortae, mit dem Pulmonalarterienbogen in Verbindung steht. So lange die Lungen in ihrer Entwicklung nur wenig vorgegeschritten sind und nur einen kleinen Theil des aus dem rechten Herzen in die Lungenarterie geworfenen Blutes aufnehmen, wird die Aorta descendens vorzugsweise von der Arteria pulmonalis und nur in geringem Masse von der eigentlichen Aorta gespeist. Dieses Verhältniss ändert sich mit dem allmählichen Wachsthum der Lungen. Je mehr Blut dieselben aus der Pulmonalarterie für sich in Anspruch nehmen, desto weniger fliesst aus dieser in die Aorta descendens ab. Der Pulmonalarterienbogen (Ductus arteriosus Botalli) passt sich diesen neuen Verhältnissen an und wird nach und nach enger. Mit dem vermehrten Blutzufuss zu den Lungen ist jedoch auch ein vermehrter Rückfluss in das linke Herz bedingt; dieses wirft also ein dem geringeren Abfluss aus der Arteria pulmonalis in die Aorta descendens entsprechendes Plus an Blut in die eigentliche Aorta; der Blutdruck in die-

ser steigt, es muss eine grössere Blutmenge aus ihr durch den Isthmus Aortae in die Aorta descendens abfliessen, und der Isthmus wird dementsprechend passiv erweitert. Zur Zeit der Geburt stellt schliesslich die Aorta descendens die directe Fortsetzung der eigentlichen, früher nur für Kopf und obere Extremitäten bestimmten Aorta dar; aus der Pulmonalarterie fliesst mit dem ersten Athemzuge überhaupt kein Blut mehr in die Aorta descendens, und in den ersten 9—12 Tagen nach der Geburt ist das nur noch enge Verbindungsstück zwischen Pulmonalarterie und Aorta descendens vollständig obliterirt und setzt sich als Ligamentum (Ductus) arteriosum Botalli an der concaven Seite des nunmehrigen Aortenbogens gegenüber dem Ursprung der linken Schlüsselbeinarterie an. Als letzte Andeutung des Isthmus sieht man zuweilen bei Neugeborenen noch eine ganz geringe Verjüngung der Aorta oberhalb der Insertion des Botallischen Ganges.

Auf diese foetalen Kreislaufverhältnisse sich stützend hat Rokitansky seine heute allgemein anerkannte Theorie über die Entstehung der Stenose und Obliteration der Aorta an der Insertionsstelle des Ductus arteriosus Botalli aufgestellt. Unter Beibehaltung der Hamernjk'schen Eintheilung in drei Gruppen giebt er als Ursache der Anomalie die Persistenz des Isthmus Aortae an und erst in zweiter Linie die Involution des Ductus arteriosus. Die Entstehung der einen oder andern Hamernjk'schen Gruppe erklärt Rokitansky aus der mehr oder weniger tiefen Einsenkung und der mehr oder weniger schiefen Richtung der Einsenkung des Isthmus in den Pulmonalarterienbogen verbunden mit dem Zuge des sich involvirenden und schrumpfenden Ductus Botalli. Rokitansky sagt (Spec.

patholog. Anatom. 1856 Bd. II. p. 339.): „Nimmt man billigermassen an, dass die an der Einsenkungsstelle des Isthmus Aortae begrenzte Schrumpfung des Ductus arteriosus nicht über einen Kreisabschnitt des Gefässrohres hinausgreift, so entfallen je nach der Stelle jener Einsenkung nach bei-



stehendem Schema für dass arteriöse Band die durch die Durchschnitte a a a begrenzten Stücke. Nimmt man nun ferner an, dass bei einer Einsenkung wie bei 1 der Zug des schrumpfenden Ductus arteriosus in der Richtung der Linie b Statt hat, so fällt die endliche

Obliteration des Isthmus mit der Insertionsstelle des arteriösen Bandes zusammen. Findet der Zug in einer der vorigen parallelen Richtung bei einer Einsenkung wie bei 2 statt, so wird die Obliteration des Isthmus in und oberhalb der Insertionsstelle des arteriösen Bandes fallen. Findet der Zug ebenso bei einer Einsenkung wie bei 3 statt, so wird die Obliteration unterhalb der Insertion des arteriösen Bandes fallen.“ Wenn man in der beigegebenen Rokitansky'schen Figur festhält, dass die Mitten von a a a die Insertionsstellen des involvirten Ductus bezeichnen, die Schnittpunkte von b u. a die jedesmalige Lage der Stenose, so lässt sich der Rokitansky'sche Satz ohne Weiteres aus der Figur ablesen.

Auf Rechnung des Zuges vom schrumpfenden Ductus Botalli haben wir noch zwei Erscheinungen zu setzen, welche an fast allen Präparaten mit gleicher Deutlichkeit auftreten,

d. i. einmal die besonders starke Einsattelung der Gefässwand am oberen Umfang der Stenose sowie die Erscheinung, dass der stenosirte oder obliterirte Strang nicht in der Axe des Aortenbogens liegen bleibt sondern nach dessen concaven Seite abweicht.

Welche Verhältnisse nun eine Ausdehnung des Isthmus zu der normalen Weite der Aorta verhindern, wissen wir nicht. Vielleicht werden vergleichend histologische Untersuchungen der Wandung des Isthmus beim Foetus und des persistenten Isthmus bei neugeborenen Kindern hierüber Aufklärung schaffen. Auch die oben erwähnte Langer'sche Vermuthung des gleichen Baues des Isthmus Aortae und des Ductus arteriosus Botalli mag hier registriert werden. Der Uebergang der Stenose der Aorta in vollständige Obliteration wird begünstigt durch die Entwicklung eines möglichst vollkommenen Collateralkreislaufes. Der enge Isthmus kommt bei der Leichtigkeit, mit der alsdann das gesammte Blut der Aorta ascendens in die grossen Bogengefässe abfließt, immer mehr ausser Function, wird schliesslich ganz entbehrlich und kann sich schliessen. Offen bleibt dabei die Frage, inwieweit vielleicht der Zug des schrumpfenden Ductus Botalli oder ein im Isthmus vorhandener Involutionsvorgang oder endarterielle Vorgänge auf Steigerung der Stenose bis zur Obliteration Einfluss haben.

Im Anschluss an die vorzügliche diese Anomalie behandelnde Arbeit Kriegk's (Vierteljahrsschrift für die pract. Heilk., Prag u. Leipzig. 1878, XXXV, 1. p. 47) möchte ich auf die Frage eingehen, ob die Stenose der Aorta intra- oder extrauterin erfolgt. Wenn in der letzten Zeit des foetalen Lebens mit der allmählichen Verengung des

Pulmonalarterienbogens der Blutdruck in der eigentlichen Aorta steigt, der Isthmus aber aus irgend welchen Ursachen der passiven Erweiterung Widerstand leistet, so kann unbedenklich schon intrauterin ein Collateralkreislauf vermittels der grossen Bogengefässe entstehen. Leisten jedoch auch die Bogengefässe der Erweiterung einen absoluten oder relativen Widerstand, so wird der Blutdruck in der Aorta auf das linke Herz und durch das foramen ovale auch auf das rechte zurückwirken. Die Arteria pulmonalis erhält deshalb mehr Blut und wird sich ihres überschüssigen Blutes durch den Ductus arteriosus Botalli entledigen. Hierdurch wird die Involution des Ductus arteriosus aufgehalten, und er bleibt entweder für das ganze Leben offen — hierher gehören nach Kriegk alle diejenigen Fälle, in welchen die Aorta descendens aus der Arteria pulmonalis entspringt — oder es tritt bei allmählicher Erweiterung der grossen Bogengefässe und dem damit verbundenen Ausserfunctiontreten des Ductus eine Spätinvolution dieses Ganges ein, die einen mangelhaften Verschluss zur Folge haben kann. Mangelhafter Verschluss des Ductus arteriosus beweist also einen nicht genügend entwickelten Collateralkreislauf bei Persistenz des Isthmus zur Zeit der Geburt. In diesen Fällen muss sich der spät involvirte, unvollkommen geschlossene Ductus natürlich unterhalb der stenosirten Stelle der Aorta inseriren. Bei dieser Gruppe der Aortenstenosen ist also nach Kriegk eine intrauterine Entstehung möglich und bei gleichzeitigem Offensein des Ductus arteriosus Botalli wahrscheinlich. Darauf hat übrigens vor Kriegk auch schon Hamernjk (Vierteljahrsschrift für d. pract. Heilk. 1844 I, 1 p. 58). hingewiesen. So ist sicher die Rauchfuss'sche Stenose bei einem drei Wochen alten Kinde intrauterin ent-

standen. Ein Collateralkreislauf hat sich nicht ausgebildet, obgleich das Herz redlich daraufhin gearbeitet hat, denn es hat die Grösse des Herzens eines acht Monate alten Kindes. Eine solche Hypertrophie konnte in der kurzen Zeit nach der Geburt nicht entstehen. Dem Mangel eines Collateralkreislaufes entsprechend hat der Ductus arteriosus Botalli die Weite der Arteria pulmonalis und Aorta descendens. Dagegen darf man eine intrauterine Entwicklung der Stenose bei Insertion des Ductus an oder oberhalb derselben nicht annehmen, weil man alsdann genöthigt wäre an foetale Kreislaufsverhältnisse zu denken, wie sie nie möglich sind, nämlich Erguss des Blutes aus dem linken und rechten Ventrikel des Herzens in den blind geschlossenen oder stenosirten Aortenbogen bei Ausschluss der Aorta descendens von jeglicher Blutcirculation.

Es ist bereits einige Male von dem Zustandekommen eines Collateralkreislaufes die Rede gewesen. Ich möchte bei dem Mechanismus desselben ein Wenig verweilen und komme damit zu den Folgen, welche die Stenose und Obliteration der Aorta auf den Gesamtorganismus hat. Die Gefässe, die sich an dem Collateralkreislauf zur Versorgung des unteren Körperabschnittes mit Blut betheiligen, sind einerseits Aeste der Arteria subclavia, andererseits solche der Aorta thoracica und abdominalis und der Arteriae iliacae. Es anatomisiren

- 1) die Arteria mammaria interna durch die Rami intercostales anteriores mit den Arteriae intercostales aus der Aorta thoracica, durch die Arteria musculophrenica mit der Arteria phrenica aus der Aorta, durch die Arteria epigastrica inferior aus der Arteria iliaca externa (cruralis), mit der Arteria iliolumbalis aus der

- Arteria iliaca interna (hypogastrica), mit der Arteria lumbalis aus der Aorta lumbalis,
- 2) die Arteria intercostalis suprema durch quere Anastomosen mit den obersten Arteriae intercostales aorticae,
 - 3) die Arteria transversa scapulae mit dem Ramus descendens aus der Arteria transversa colli und mit der Arteria circumflexa scapulae aus der Arteria subscapularis,
 - 4) die Arteria transversa colli durch den Ramus descendens mit den Rami perforantes posteriores aus den Arteriae intercostales aorticae und mit den Arteriae lumbales aus der Aorta,
 - 5) die Arteria thoracica longa mit den Rami perforantes laterales aus den Arteriae intercostales aorticae,
 - 6) die Arteriae subscapulares durch die Arteriae thoracodorsalis und circumflexa scapulae mit den Arteriae intercostales aorticae.

In dieser Weise werden sowohl die Aorta descendens als auch direct die Gefäße der untern Extremitäten mit Blut versehen. Die am Collateralkreislauf betheiligten zuführenden Arterien sind in ganz ausserordentlichem Grade erweitert. In dem von Paris (Désault, Journal de Chirurgie. T. II. 1789. desgl. Tiedemann l. c. p. 47.) mitgetheilten Falle waren die Arteria anonyma und subclavia sinistra noch einmal soweit als gewöhnlich, die Arteria transversa colli war beiderseits um das Doppelte, die obersten Interkostalarterien um das Vierfache erweitert, ähnlich die Arteria mammaria interna und intercostalis suprema. In dem Reynauld'schen Falle eines 92jährigen Mannes (Journ. hebdomat. de méd. 1818. V. 1. 161. desgl. Tiedemann l. c. pag. 248)

hatte die Arteria transversa colli den Umfang einer Arteria brachialis und die Arteria mammaria interna einen noch grösseren. Aehnliches beschreibt Jordan (Tiedemann l. c., ferner North. Journ. of med. and surg. V, 1. p. 101. London. 1830.) In unserem noch zu erwähnenden Falle hatte die letzte Subscapulararterie einen grösseren Umfang als der nach ihrem Abgange restirende Stamm (die Arteria axillaris vor dem Abgange der subscapularis 2,2 ctm. Umfang, hinter demselben 1,5; die subscapularis am Ursprunge 1,8 ctm.) — Im Gegensatz hierzu ist die Aorta descendens und besonders die Arteria cruralis in mehreren Fällen enger als normal gefunden worden. Es ist übrigens einleuchtend, dass der Kreislauf streckenweise ein umgekehrter ist als gewöhnlich, indem die abführenden Arterien des Collateralkreislaufes, ähnlich den Venen, das Blut sammeln, um es dem Hauptgefäss, aus dem sie es sonst abführen, zuzuführen; so verhalten sich die Arteriae intercostales aorticae, die Arteria epigastrica inferior u. a.

Um einen so vollständigen Collateralkreislauf herzustellen und zu erhalten, muss das Herz eine ganz immense Arbeit leisten. Wir finden daher in fast allen Fällen die Angabe, dass der linke Ventrikel hypertrophisch war, bald mit bald ohne Erweiterung seiner Höhle. Ist diese Hypertrophie auch heilsam und erwünscht, so dürfen wir doch nicht vergessen, dass jeder Hypertrophie des Herzens ein Stadium der fettigen Degeneration mit ihren Gefahren folgt. Die im Verlaufe der Aortenstenose relativ häufig auftretende Herzruptur haben wir auf das Conto dieser Verfettung zu setzen. Wir kommen damit zu den unangenehmen Complicationen, zu welchen die Stenose und Obliteration der Aorta Veranlassung giebt. Der grössere

Kraftaufwand des linken Ventrikels macht sich an der Aorta ascendens in einer Erweiterung ihres Anfangstheils geltend. Eine solche Erweiterung ist in den meisten Fällen constatirt. Eine relative Insufficienz der Aortenklappen braucht damit nicht verbunden zu sein; dieselben sind dem grösseren Umfange des Aortenostiums entsprechend ebenfalls vergrössert, — ausgedehnt gefunden worden. Durch den permanent hohen Blutdruck im linken Herzen und in der Aorta ascendens ist ferner eine schwere Schädigung des Circulationsapparates durch Irritation der Aortenintima und des Herzendocards bedingt. In den meisten Fällen wird denn auch von mehr oder weniger hochgradigen atheromatösen Processen der Aorta vor der stenosirten Stelle berichtet, freilich auch von solchen unmittelbar hinter derselben. Diese will Kriegk (l. c.) von einer mangelhaften Ernährung dieses Gefässstückes abgeleitet wissen. Atheromatöse Veränderungen und hoher Blutdruck sind die Ursache von den bei dieser Anomalie auffallend häufig auftretenden Aortenaneurysmen mit Ruptur derselben. Endocarditiden mit ihren Folgen, Auflagerungen auf den Klappen und Verwachsung derselben, sehen wir etwas seltener auftreten als die eben besprochenen endarteriitischen Processe in der Aorta.

Der in so grossartiger Vollkommenheit hergestellte Collateralkreislauf lässt uns das vorzügliche Wohlbefinden der mit Stenose oder Obliteration der Aorta behafteten Individuen einigermassen erklärlich finden. Einige derselben haben ganz kolossale Strapazen ohne irgend welche bemerkenswerthe Symptome ertragen. So berichtet Tiedemann (l. c. p. 15) von einem Manne, der mit 15 Jahren Soldat wurde, die französischen Revolutionskriege mitmachte,

im Ganzen 25 Jahre diente, alsdann wegen Wassersucht pensionirt noch 29 Jahre als Tagelöhner lebte; dabei war der Mann potator strenuus und Syphilitiker. Einen Fall aus der neuesten Zeit berichtet Stabsarzt Dr. Sommerbrodt (Virchow, Archiv 91. p. 193. 1883.) Es handelt sich um einen kräftigen Soldaten, der 16 Jahre diente und es bis zum Wachtmeister gebracht hatte, dann wegen eines Schlaganfalls Invalide geworden nach 12 Jahren unter Hirnsymptomen starb. Das Grossartigste leistete jedoch ein von Eichler behandelter österreichischer Officier (Roemer, medizinische Jahrbücher des österr. Staates 1839. N. F. Bd. 20 p. 2. desgl. Tiedemann l. c. p. 64), der trotz völliger Obliteration der Aorta alle Feldzüge von 1790—1815 mitgemacht und das Leben in vollem Masse genossen hatte und erst mit 50 Jahren mitten in heiterster Laune beim Kartenspiel in einem dyspnoischen Anfall verschied. Ich schweige von Leuten, die ihr Leben als Lastträger, Boten, Fleischer und dergl. verbrachten.

Und doch ist man durchaus nicht berechtigt, wie Hamernjk und Oppolzer (Prager Vierteljahrsschrift V, 4. p. 67. 1848) es thun, der Aortenobliteration einen jeden Einfluss als Krankheitsursache abzusprechen. Ein Zusammenhang zwischen unmittelbarer Todesursache und der bestehenden Anomalie kann in fast jedem gut beobachteten Falle nachgewiesen werden.

Kriegk hat in seiner bereits erwähnten Arbeit die ihm bekannten 54 Fälle von Stenose und Obliteration der Aorta in der Gegend der Insertion des Ductus arteriosus Botalli zusammengestellt und ihnen drei neue hinzugefügt. Seine Tabelle* giebt folgende Resultate: „Die 56 Fälle be-

* Der letzte Fall von Kriegk ist, weil erst als Nachtrag mitgetheilt, in dieselbe noch nicht aufgenommen.

treffen 42 männliche und nur 12 weibliche Individuen, während bei 2 das Geschlecht nicht angegeben ist. Das Alter, in welchem der Tod erfolgte, ist in 5 Fällen nicht angegeben, bei den andern vertheilt es sich: 1—10. Jahr 6 Fälle, 10—20. Jahr 9 Fälle, 20—30. Jahr 10 Fälle, 30—40. Jahr 9 Fälle, 50—60. Jahr 5 Fälle, 60—70. Jahr 2 Fälle, 70 bis 80. und 80—90. Jahr 0 Fälle, 92. Jahr 1 Fall. 45 Mal liegt eine Stenose vor und 11 Mal eine Obliteration. Die Stenose oder Obliteration befindet sich 8 Mal oberhalb, 17 Mal an und 21 Mal unterhalb der Insertion des Ductus Botalli und 10 Mal ist die Insertion nicht näher angegeben. — Der Ductus Botalli ist 23 Mal geschlossen, 15 Mal ganz oder theilweise durchgängig und 18 Mal sind keine Angaben gemacht. — Die Aortenwand vor der Stenose ist nur 9 Mal als normal angegeben, bei 23 Fällen sind keine Angaben gemacht und bei 24 finden wir beginnende oder hochgradige Degeneration der Wandung. — Der Tod trat ein: in 10 Fällen durch Ruptur der Aorta, 3 Mal durch Ruptur des Herzens, 3 Mal in Folge von Apoplexie, 8 Mal durch Pneumonie, 2 Mal durch Bronchitis capillaris. In 4 Fällen erfolgte er plötzlich, wie es scheint, durch Lungen-oedem, 8 Mal in Folge von Herzfehlern und zwar meist mit Hydrops, 2 Mal, wie es scheint, durch Paralyse mit Stauung in 4 Fällen durch Stauungshydrops, 1 Mal durch pleuritische Exsudat, in 1 Falle durch Tuberculose und in einem andern Falle durch Diabetes mellitus mit Tuberculose. Einmal war er Folge von Pyaemie, die von einer Aderlasswunde aus entstanden war, 1 Mal war Morbus Brightii die Veranlassung, 1 Mal Marasmus. Ein anderes Mal, wo Gehirn und Rückenmark bei der Section nicht besichtigt wurden, ist die Ursache nicht sicher bekannt, doch lag dabei eine caries der

Wirbelsäule und Verkäsung der Bronchialdrüsen vor. 5 Mal endlich finden sich keine Angaben über die Todesursache.

Als besonders beachtenswerth möchte ich aus dieser Tabelle hervorheben den hohen Procentsatz von Todesfällen durch Ruptur der Aorta und des Herzens ($23,3\%$) und die kolossale bisher nicht erklärte Verschiedenheit in der Vertheilung der Anomalie auf das männliche und weibliche Geschlecht ($= 77,7\% : 22,2\%$). Darauf haben Oppolzer (Vierteljahrsschrift für d. prakt. Heilkunde. Prag 1848, V, 3. p. 68.) Lebert (Virchow, Archiv 1852 Bd. IV. p. 369.) und Kriegk (l. c.) in gleicher Weise als etwas ganz Merkwürdiges hingewiesen. Ich glaube, dass diese Erscheinung sehr einfach erklärt werden kann. Im Breslauer pathologischen Institut kommen durchweg fast noch einmal soviel männliche als weibliche Leichen zur Section. Liegen diese Verhältnisse an andern Krankenhäusern und Kliniken ähnlich, so ist man genöthigt ohne Weiteres eine noch einmal so häufige Constaturung der Stenose und Obliteration der Aorta bei Männern als bei Frauen zu erwarten. Wenn wir statt dieses Verhältnisses von 2 : 1 ein solches von 3,5 : 1, oder auf gleiche Anzahl von Sectionen gebracht, von 1,75 : 1 finden, so scheint mir der Grund dafür zunächst darin zu liegen, dass in der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts das Verhältniss der zur Section gelangenden männlichen und weiblichen Leichen ein noch ungleicheres gewesen sein mag. Wenigstens ist das Verhältniss in der Vertheilung der Fälle ein ganz anderes, wenn man die Fälle bis 1852 von den spätern trennt. Lebert sind bis zu jenem Jahre 18 Fälle von Stenose und Obliteration bekannt; dieselben vertheilen sich auf 15 Männer und 3 Frauen, d. i. ein Verhältniss von 5 : 1, dagegen stellt sich das Verhältniss vom

Jahre 1852 bis 1878 auf 27 Männer zu 9 Frauen, wie 3 : 1 auf gleiche Anzahl von Sectionen gebracht wie 1,5 : 1 oder auf 100 bezogen wie 60⁰/₀ zu 40⁰/₀. Dieses thatsächliche Verhältniss nimmt sich ganz anders aus als das ursprüngliche, scheinbare von 42 : 12 oder 3,5 : 1 oder 77,7⁰/₀ : 22,2⁰/₀. Aber auch von dem Verhältnisse 1,5 : 1 ist anzunehmen, dass es dem wirklichen Vorkommen der Aortenstenose beim männlichen und weiblichen Geschlecht nicht entspricht. Wenn man erwägt, dass die Frau, mag ihre Beschäftigung sein, welche es wolle, im Grossen und Ganzen lange nicht den gleichen körperlichen Anstrengungen und Strapazen unterworfen ist als der Mann, so wird sie bei gleich gut entwickeltem Collateralkreislauf hinsichtlich der üblen Folgen im Geleite der Stenose und Obliteration der Aorta unzweifelhaft im Vortheil sein. Die Frau ist ceteris paribus weniger genöthigt wegen dieser üblen Folgen die Hilfe des Krankenhauses in Anspruch zu nehmen, und die Fälle von Stenose und Obliteration der Aorta beim weiblichen Geschlecht müssen demnach weniger häufig zur Cognition des diagnosticirenden oder obducirenden Arztes gelangen. Mit Berücksichtigung dieses Umstandes glaube ich zu der Annahme eines gleich häufigen Vorkommens der Stenose und Obliteration der Aorta beim männlichen und weiblichen Geschlecht berechtigt zu sein.

Zu den von Kriegk angeführten 57 Fällen kommen noch 6, bei denen die Diagnose gestellt, aber keine Section vorgenommen worden ist, ferner gehören hierhin 7 von Kriegk zwar angeführte, aber in seine Tabelle nicht aufgenommen, weil ihm nicht zugängliche Fälle. Schliesslich bin ich in der Lage noch 5 theils von Kriegk übersehene, theils erst nach dem Erscheinen seiner Arbeit veröffentlichte Fälle anzugeben:

- 1) Liouville, Gazette méd. de Paris. 1869. p. 205.
Mann, 44 Jahre alt, Obliteration unterhalb der Insertion des Ductus, Ductus obliterirt.
- 2) Legg, Transact. of the pathol. Soc. XXIX p. 65. 1878.
Mann, 20 Jahre alt, Obliteration an der Insertionsstelle des Ductus, Ductus ligamentös. Ruptur der Aorta.
- 3) Rauchfuss, St. Petersburg. med. Zeitschr. 1864.
Bd. VI. p. 376. Stenose des Isthmus.
- 4) Peacock, On Malformations of the human heart, London. 1866. 2. Auflage. pag. 152. 10 Wochen altes Kind, Stenose oberhalb der Insertionsstelle des Ductus, Ductus weit offen, führt direct in die Aorta descendens.
- 5) Sommerbrodt, Virchow, Archiv 1883. Bd. 91. p. 492.
Mann, 46 Jahre alt, Obliteration unterhalb der Insertionsstelle des Ductus, Ductus obliterirt. Apoplexie.
Die Fälle 1—4 sind mir leider nicht aus den Originalarbeiten bekannt.

Ich schliesse hier einen im pathologischen Institut zu Breslau beobachteten Fall von Obliteration der Aorta unterhalb der Insertionsstelle des Ductus arteriosus Botalli an. Für die gütige Ueberlassung des Falles sowie des klinischen Krankenjournal sage ich den Herren Professor Dr. Ponfick und Geheimen Medicinalrath Professor Dr. Biermer meinen verbindlichsten Dank.

Krankengeschichte.

Eugen K., 29 Jahre alt, zuletzt Commis, giebt an nur Kinderkrankheiten durchgemacht zu haben, sonst will er stets gesund gewesen sein; insbesondere erklärt er mit Bestimmtheit nie Gelenkrheumatismus gehabt zu haben. Ueber Herz-

klopfen und Athemnoth hatte er niemals zu klagen. Syphilitische Infection wird durchaus geleugnet, auch lassen sich anamnestiche keine Anzeichen für Syphilis feststellen. Seine jetzige Erkrankung begann am 20. Juni 1883. Während er am Vormittag gegen 11 Uhr damit beschäftigt war Zucker in Tonnen zu füllen, verspürte er eine allmählich zunehmende Schwäche und Müdigkeit im linken Arm. Es war ihm, als wenn derselbe langsam absterbe, er konnte ihn nur noch sehr schwer gebrauchen; er hatte dabei immer ein Gefühl von Kribbeln und Ameisenkriechen. Als er gegen 1 Uhr in seine Wohnung ging, merkte er zwar, dass es ihm mit dem linken Bein etwas schwer fiel zu gehen, doch schleifte er den Fuss noch nicht nach. Beim Mittagessen konnte er noch die Gabel zwischen Daumen und Zeigefinger der linken Hand fixiren, Bewegungen konnte er mit denselben nicht mehr machen. Als er später eine Cigarre zwischen denselben Fingern halten wollte, fiel ihm dieselbe herunter. Nachmittags bekam er auch im linken Bein dasselbe Gefühl von Müdigkeit wie im Arm und dann schleifte er dasselbe nach. Doch konnte er Bewegungen damit immer ausführen. Irgend welche Sensibilitätsstörungen hat Patient nicht bemerkt; vielmehr hatte sich am andern Tage das Kribbeln verloren. Patient behauptet ferner keine wesentlichen Veränderungen in seiner Sprache bemerkt zu haben, höchstens glaubt er früher lauter gesprochen zu haben. Sonstige Symptome sind beim Patienten nicht aufgetreten, besonders kein Schwindel oder Kopfschmerz. Auch Störungen im Bereiche der Hirnnerven hat Patient nicht wahrgenommen. Er ging am 21. Abends in das Kloster der Barmherzigen Brüder, fand aber dort wegen Ueberfüllung keine Aufnahme. Er wurde dann noch an demselben Abend

— aus welchem Grunde ist bei den mangelhaften Aussagen des Patienten nicht recht ersichtlich — in das Polizeigefängnis gebracht und von da den 22. Juni Abends nach der Königl. Med. Klinik geschafft. Von Angehörigen des Patienten wurde nachträglich in Erfahrung gebracht, dass Patient Soldat war, nach $1\frac{1}{2}$ Jahren erkrankte und mit der Diagnose „Herzfehler“ vom Militair entlassen wurde. Patient war ferner leidenschaftlicher Tänzer; er hatte bei dergleichen Vergnügungen nie über Herzklopfen oder Athemnoth zu klagen.

Status. 22. Juni 1883. Patient ist ein mässig genährter Mann von ziemlich gut entwickelter Muskulatur und kräftigem Knochenbau. Temperatur bei der Aufnahme 37° C., Puls regelmässig, kräftig, 72 Schläge pro Minute; Radialarterie gespannt. Gesichtsausdruck echauffirt, Wangen und Lippen stark geröthet. Patient liegt gewöhnlich auf der linken Seite und ist nicht im Stande spontan seine Lage zu verändern. — Die Zunge ist ganz frei von Belag, weicht ein wenig nach links ab, zittert nicht. — Der rechte Arm und das rechte Bein werden häufig spontan bewegt, die linksseitigen Extremitäten dagegen nicht. Auch auf Geheiss kann Patient den linken Arm nur sehr unvollkommen vom Lager erheben, indem dabei der Oberarm gar nicht bewegt wird oder Ellbogen auf das Lager aufgestützt und der Vorderarm, an dem die Hand schlaff herabhängt, nur ganz wenig von der Unterlage entfernt wird. Die Finger und die Hand können für sich willkürlich gar nicht bewegt werden. Passive Bewegungen finden nur im Ellbogen- und Schultergelenk ganz geringen Widerstand. Die linke Hand und das untere Fünftheil des linken Vorderarms sind geröthet, die Haut am Handrücken und an den Fingern ist geschwollen. Die Be-

wegungen des linken Beines werden in Rückenlage im Beinicht ganz so schnell und ausgiebig ausgeführt, wie die des rechten, doch ist der Unterschied sehr unbedeutend. Die Prüfung der Schmerzempfindlichkeit durch Nadelstiche ergibt, dass dieselben leicht und prompt empfunden werden während die Localisation derselben keine ganz genaue ist, doch begeht Patient dabei keine bedeutenden Fehler. — Der Patellarreflex ist auf beiden Seiten lebhaft aber gleich, Fussklonus fehlt. Die Stirn kann willkürlich beiderseits nicht gerunzelt werden. Der Schluss des linken Auges erfolgt zwar momentan, ist aber ein sehr loser und kann willkürlich auch nicht die kürzeste Zeit festgehalten werden. Die Nase wird beiderseits gut gerümpft. Beim Aufblasen der Backen bläht sich die linke Wange ausserordentlich viel stärker als die rechte. Beim Zeigen der Zähne ist von diesen sowohl oben als unten rechts viel mehr zu sehen als links; dabei ist die Mundspalte, indem sie sich rechts mehr erweitert als links, asymmetrisch. Den Mund kann Patient spitzen und ebenso kann er pfeifen. Die Sprache des Patienten ist sehr undeutlich, schlecht articulirt; dabei ist keine Spur von Aphasie vorhanden. Subjectiv wird eine Erschwerung der Sprache nicht empfunden. — Die linke Pupille ist nicht um erheblich enger als die rechte; beide sind etwa mittelweit und reagiren gut auf Lichteinfall. Die Bewegungen der Augen sind insofern nicht ganz normal, als beim Blick nach oben die linke Pupille erheblich weiter nach oben geführt wird als die rechte. Kopfschmerzen, Schwindel, Uebelkeit, Erbrechen, sowie überhaupt irgend welche Schmerzen oder sonstige subjective Beschwerden werden geleugnet. — Das Sehvermögen des Patienten ist angeblich normal; eine ganz oberflächliche Prüfung scheint das zu bestätigen. Der

Augenhintergrund wird bei der Untersuchung mit dem Augenspiegel normal gefunden. Patient kann ohne Unterstützung stehen, ebenso auch gehen. Beim Gehen wird die linke Fusssohle nur sehr wenig abgehoben und schleift bei jedem Schritt mit der vorderen Hälfte auf dem Fussboden. Das Sensorium des Patienten ist entschieden nicht ganz frei. Sein Benehmen bei der Untersuchung ist so stupid, wie es mit seinem Stande nicht recht übereinstimmt. — Die Untersuchung des Herzens ergibt, dass man den Herzstoss nicht sieht und links vorn im vierten Intercostalraum nach innen von der Mammillarlinie und in derselben ziemlich schwach fühlt. Ein fühlbares Reiben oder Schwirren ist nicht vorhanden. Die Herzdämpfung beginnt als relative an der dritten Rippe, als absolute im dritten Intercostalraum und geht nach unten bis zum untern Rande der fünften Rippe; rechts beginnt sie am rechten Sternalrande, als relative sogar zwei Querfinger nach aussen davon und geht nach links bis in die Mammillarlinie; sie ist sehr intensiv. Bei der Auscultation hört man an der Herzspitze ein mässig lautes systolisches und diastolisches Geräusch, von welchem das letztere lauter ist, beide von fast schabendem Character. Sie pflanzen sich nach der eigentlichen Auscultationsstelle der Aorta nicht fort, woselbst man einen reinen ersten und starken zweiten Ton hört. In der Pulmonalgegend ist das diastolische Geräusch sehr gut zu hören. Auf dem Sternum von der zweiten Rippe ab hört man ein schwaches systolisches Geräusch und einen stark accentuirten zweiten Ton. Von der vierten Rippe ab hört man auf dem Sternum auch etwas von dem diastolischen Geräusch, in der Tricuspidalisgegend wieder nur das systolische und einen starken zweiten Ton; am rechten Sternalrande im Bereich der vierten und fünften Rippe hört man

das diastolische Geräusch wieder stärker. — Im linken Pectoralis maior werden anhaltende fibrilläre Zuckungen beobachtet, im rechten gar nicht. — Die electricische Contractilität der Muskeln ist überall gut erhalten. — Der Stuhlgang ist festweich. Der Urin ist klar, hellgelb, spec. Gew. 1013, eiweissfrei. Therapie: Kalium jodatum.

Résumé: 29 Jahre alter, mässig genährter, kräftig gebauter Mann. Stupides Benehmen. Parese des linken Lidfacialis und Mundfacialis. Stärkere Lähmung des linken Armes und Beines bei intacter Sensibilität und gut erhaltener electricischer Contractilität. Undeutliche Sprache. Systolisches und diastolisches Geräusch am Herzen, am lautesten am oberem Theile des Brustbeinkörpers und an der Tricuspidalis. Verbreiterung der Herzdämpfung nach rechts. Urin eiweissfrei.

23. Juni. Die Parese des Lidfacialis ist etwas geringer geworden; der übrige Befund ist derselbe geblieben.

24. Juni. Von den Herzgeräuschen ist jetzt nur noch das diastolische Geräusch an der Herzspitze und an der Tricuspidalis zu hören.

25. Juni. Heute kann man von den Herzgeräuschen nichts mehr deutlich hören. Patient lässt den Urin untersuchen und hat dies jedenfalls schon an den vorhergehenden Tagen gethan; er behauptete nur anfangs, dass er das Urin-glas umgestossen hätte.

26. Juni. Der erste Ton an der Mitralis und an der Aorta ist unrein, eigentliche Geräusche aber sind nicht zu hören. Der zweite Ton an der Mitralis sowie an der Pulmonalis ist stark accentuirt. Sonst sind keine Veränderungen zu constatiren.

27. Juni. Am Herzen sind keine deutlichen Geräusche zu hören. Der erste Ton an der Mitralis ist unrein, der

zweite Ton wie bisher accentuirt. Die Parese des Mundfacialis besteht noch fort. Die Zunge wird beim Herausstrecken nach links verschoben. Der Lidschluss erfolgt besser wie früher, ist aber noch nicht so fest als auf der rechten Seite. Der Arm ist noch vollständig gelähmt. Die Stupidität des Patienten hat noch sehr zugenommen.

30. Juni. Der Patient klagt über grosse Kopfschmerzen; dieselben liessen ihn des Nachts nicht schlafen. Er lässt den Urin immer noch unter sich; sonst hat sich nichts geändert.

5. Juli. Der Zustand des Patienten hat sich bedeutend gebessert. Patient lässt den Urin nicht mehr ins Bett. Das Sensorium ist freier. Die Parese des Facialis ist noch ebenso, wie sie war; Patient kann den Arm und das Bein etwas bewegen.

12. Juli. Patient steht schon auf und geht im Zimmer umher. Das linke Bein wird wie ein gelähmtes nachgeschleppt. Der linke Arm wird im Hand- und Ellbogengelenk langsam aber ziemlich gut bewegt, dagegen im Schultergelenk nur sehr mühsam etwas gehoben.

16. Juli. Der Allgemeinzustand des Patienten ist ein guter; nur klagt Patient jetzt über Schmerzen im linken Schultergelenk; bei passiven Bewegungen fühlt man zuweilen Crepitiren. Die Beweglichkeit des Armes und des Beines ist dieselbe. Patient ist ganz ausser Bett und läuft herum.

18. Juli. Gestern Abend, als die andern Patienten schliefen, fing Patient an im Bett laut zu sprechen; was er sprach, konnte nicht verstanden werden; etwas später stieg er aus dem Bett, belästigte den neben ihm liegenden Patienten, welchen er aus dem Bette werfen wollte, weil er glaubte, es sei sein Bett. Darauf wurde er ins Bett gebracht, schlief nach einiger Zeit ein und schlief bis heute früh.

Heute ist das Sensorium benommen, der Gesichtsausdruck stupid. Patient ist zum Sprechen nicht zu bewegen.

19. Juli, Vormittag. Das Sensorium des Patienten ist heute in noch schlechterem Zustande als gestern. Es ist unmöglich von ihm irgend eine Antwort zu erhalten. Er sieht den Fragenden nur mit einem stieren Blick und äussert stupiden Gesichtsausdruck an und zeigt auf keine Weise, dass er das Gehörte verstanden habe. Eine Aenderung der Motilitätserscheinungen der Extremitäten ist nicht wahrzunehmen. Nadelstiche werden überall empfunden; doch scheint am ganzen Körper die Schmerzempfindung eine sehr stumpfe zu sein, indem erst wiederholte und tiefe Nadelstiche Abwehrbewegungen und ein schmerzhaftes Verziehen des Gesichtes hervorrufen. Die rechte Hälfte des Gesichtes scheint ganz entschieden schwächer innervirt als die linke. Patient schlingt absolut nicht. Wenn man ihm Wasser in einem Löffel giebt, öffnet er zwar den Mund, doch lässt das Wasser, nachdem er es eine Zeit lang im Munde behalten, wieder ausfliessen. Den Urin lässt er ins Becken. Stuhlgang ist nicht erfolgt, obgleich Patient gestern 3 Pulv. Calomel à 25 Centigramm und heute Vormittag eine Einnahme erhielt. Am Herzen ist nichts Abnormes zu constatiren. Irgend etwas, was auf einen apoplektischen Insult hindeutete, ist nicht beobachtet worden.

Nachmittag. Patient liegt mit offenen Augen auf der linken Seite im Bett, gähnt häufig. Der Aufforderung sich auf den Rücken zu legen, kommt er sofort, wenn auch langsam und ungeschickt, nach. Auf die Frage, wie es ihm ginge, giebt er erst Antwort, nachdem ihm die Frage nochmals laut wiederholt worden ist. Er fängt bei weiterer Unterhaltung ohne jeden Grund zu lachen an; dabei s

vielleicht die Hautfalten unterhalb des rechten Augenlides weniger zahlreich und tief als die entsprechenden linken, die Nasolabialfalte rechts nicht ganz so tief als links, vielleicht auch der Mund nicht ganz symmetrisch; doch ist mit Sicherheit eine Parese des einen oder anderen Facialis nicht zu konstatiren. Zum Runzeln der Stirn, Schliessen der Augen, und Zeigen der Zähne etc. ist Patient nicht zu bringen; er nimmt sich überhaupt bei der Untersuchung in einer Weise, die darthut, dass er für das, was mit ihm vorgeht, nicht das geringste Verständniss hat. Sein ganzes Wesen ist ein ausserst läppisches, sodass sein psychischer Zustand gegenwärtig als eine Dementia bezeichnet werden muss, während es sich Vormittags um Stupor handelte. — Die Zunge wird auf Geheiss nicht herausgestreckt. Die Pupillen sind beiderseits stark erweitert, aber gleich. Strabismus ist nicht vorhanden. Da Patient vorgehaltene Gegenstände nicht fixirt, ist ein sicheres Urtheil über die Motilität der Augen nicht zu erlangen. Patient kann zwar den Kopf und die Augen nach der rechten Seite drehen und thut es auch zuweilen spontan, doch sind Kopf und Augen meist nach links gerichtet. Patient sieht jedenfalls; wenn man ihm einen Schlüssel vorhält und fragt, was das wäre, so giebt er die Antwort „Schlüssel“; hält man ihm alsdann ein Messer vor, so sagt er auch „Schlüssel“. Die Bewegungen der rechten oberen Extremität sind ungestört. Zu einem Händedruck ist Patient nicht zu bewegen. Der linke Arm wird auf Geheiss nur wenig erhoben, der linke Vorderarm und die linken Finger auch nur in beschränkter Weise und ungeschickt bewegt. Passive Bewegungen finden im linken Ellbogen- und Schultergelenk einen bedeutenden Widerstand. Muskulatur des linken Ober- und Vorderarms ist im Vergleich zum

rechten etwas abgemagert. Beim Liegen im Bett zeigt die Motilität der untern Extremitäten auch auf der linken Seite keine wesentliche Störung, doch ist die Prüfung wegen des unverständigen Benehmens des Patienten keine ganz zuverlässige. Der Patellarreflex, dessen Prüfung ebenfalls durch die Demenz erschwert ist, ist links lebhaft, rechts geradezu kolossal stark. Der linke Oberschenkel geräth dabei in einen fast eine halbe Minute anhaltenden Klonus; ein solcher Klonus lässt sich rechts auch durch Beklopfen der Oberschenkelmuskulatur hervorrufen. Durch Beklopfen des rechten Ober- und Unterschenkels bei erhobenem Zustand des Gliedes lässt sich ein mässiger klonischer Krampf des Beines hervorrufen, der dann in ein kurzes tonisches Stadium übergeht. Dasselbe lässt sich in geringem Grade auch am linken Bein constatiren, und zwar lässt sich der Krampf des rechten Beines auch durch Beklopfen des linken hervorrufen, aber nicht umgekehrt. Fussklonus fehlt beiderseits. Die mechanische Muskeleerregbarkeit ist überall an den Extremitäten eine ausserordentlich hochgradige; schon leises Harklopfen der Muskelbäuche ruft starke Contractionen hervor. Im Facialisgebiet ist Derartiges nicht zu constatiren, höchstens am Frontalmuskel. Die Schmerzempfindlichkeit ist, wie die Prüfung mit Nadelstichen ergiebt, überall vorhanden und nicht mehr so stumpf als heute Morgen. Die directe elektrische Muskeleerregbarkeit ist überall eine gute, die Erregbarkeit für den faradischen Strom vom Nerven aus an den obern Extremitäten eine kolossal starke, an den untern mindestens auch eine sehr gute; dabei ist rechts zu beobachten, dass bei faradischer Reizung an verschiedenen Stellen Krämpfe der ganzen rechten Extremität ausgelöst werden. Die elektrische Hautempfindlichkeit scheint nicht wesentlich vermindert.

Auf Geheiss verlässt Patient das Bett. Er kann ohne Unterstützung stehen und gehen; doch schwankt er sehr stark beim Stehen und taumelt beim Gehen so, dass er jeden Augenblick zu fallen droht; dabei macht sich eine Lähmung des einen oder andern Beines nicht bemerkbar, sondern man hat den Eindruck, als wenn er sich nur um eine Gleichgewichtsstörung handelte. Stuhlgang ist auch bis jetzt nicht erfolgt. Urin wurde verschiedene Male ins Bett gelassen. Patient hat seine Mahlzeiten zu sich genommen, schlingt ziemlich gut, hat sich jedoch beim Essen von Brod einmal stark verschluckt. — Articulation der Sprache ist nicht gestört. Temperatur normal, Puls klein, nicht beschleunigt.

Résumé. Hochgradige Dementia. Aphasische Erscheinungen nicht deutlich. Parese des linken Armes mit leichter Contractur im Ellbogen- und Schultergelenk. Keine deutliche Facialispause. Motilität der untern Extremitäten beim Liegen im Bett nicht wesentlich gestört. Stark erweiterte aber gut reagirende Pupillen. Hör- und Sehvermögen vorhanden. Neigung den Kopf und die Augen nach links gerichtet zu halten. Bedeutende Steigerung der mechanischen Muskeleirregbarkeit am ganzen Körper. Electriscbe Erregbarkeit überall sehr gut, an den obern Extremitäten sogar auffallend stark. Grosse Neigung des rechten Beines bei electrischer oder mechanischer Hautreizung in klonischen Krampf zu gerathen. Patellarreflex beiderseits sehr stark, besonders rechts; Fussklonus fehlt, ebenso Bauch- und Cremasterreflex. Urin ins Bett gelassen. Schlingvermögen ganz wenig gestört. Sehr bedeutende Störung beim Stehen und Gehen. Stuhlverstopfung. Kein Kopfschmerz. Kein Erbrechen. Temperatur normal. Puls klein, nicht beschleunigt.

20. Juli. Seit gestern Nachmittag hat sich an dem

geschilderten Zustande des Patienten nichts geändert. Heute früh stieg er aus dem Bett, urinirte in das Krankenzimmer ohne sich ein Uringlas zu nehmen, dann liess er auch mehrere diarrhoische Entleerungen ins Zimmer; er hatte gestern Abend noch eine zweite Eingiessung erhalten. Die Pupillen sind heute etwas enger. Patient schlingt ganz gut. Er lässt Urin und Stuhl ins Bett. In der Nacht hat Patient fast gar nicht geschlafen; er hat meist am Rande seines Bettes gesessen.

22. Juli. Der Zustand des Patienten ist bisher un verändert gewesen; er lag ruhig im Bett, blickte mit stierem Blick vor sich hin, liess Urin und Stuhl unter sich; zuweilen drehte er sich unruhig nach dieser oder jener Seite. In der Nacht schlief er theilweise; wenn er wach war, lag er ziemlich ruhig in der gewöhnlichen Weise da. Heute ist Patient sehr unruhig. Er macht fortwährend Bewegungen mit beiden Beinen, welche er anzieht und wieder ausstreckt, in die Höhe hebt etc., wobei zuweilen das eine oder das andere Bein in einen klonischen Krampf geräth. Mit dem rechten Arm zupft er immerfort an der Bettdecke, schiebt die Bettdecke weg und sucht aus dem Bett herauszukommen und würde herausfallen, wenn er nicht genau beobachtet würde. Der Blick ist stier; Patient spricht absolut nichts, schluckt nur zuweilen. Temperatur etwas subnormal.

Die Unruhe des Patienten nahm im Laufe des Tages noch mehr zu. Die Athmung wurde beschleunigt; Patient begann kolossal zu schwitzen. Nachmittags wurde die Athmung störtörös; es gesellte sich Trachealrasseln dazu, die Augen blieben stier, und Patient starb plötzlich Nachmittags 5 Uhr.

Section, 18 Stunden post mortem.

(Herr Professor Dr. Ponfick.)

Ziemlich stark gebaute Leiche in mässigem Ernährungs-
zustande. Musculatur sehr trocken, Fettgewebe spärlich,
Haut des ganzen Körpers blass. Thorax breit, besonders in
den mittlern und untern Partien stark gewölbt. Bauch-
decken gespannt, Bauch leicht aufgetrieben.

Stand des Zwerchfells rechts dem obern Rande der
fünften Rippe entsprechend, links ihrem untern Rande.

Herz etwas vergrössert, indem der linke Ventrikel
tiefer und dicker und etwas vorgewölbt ist; rechte Hälfte
von normaler Dimension. Weite der venösen Ostien normal,
Höhlen mittelweit, Musculatur beiderseits lebhaft braunroth,
von gleichmässigem Aussehen, derb anzufühlen. Endocard
und Klappen rechts normal. Wand des linken Ventrikels
1,5—1,7 ctm., ist sehr fest. Mitralklappe völlig frei, dagegen
die Aortenklappen insofern schwer verändert, als die rechte
und linke Aortenklappe zu einer einheitlichen, aber verzerzten
und asymmetrischen, gleichsam herabhängenden Klappe ver-
schmolzen sind. Der Rand des verschmolzenen Paares ist
stark concav, dünn und glatt, erst weiter unten das Gewebe
dicker und die verstrichenen Noduli erkennen lassend. An
der Berührungsstelle der rechten und linken Klappe fehlt
die gewohnte Einkerbung, indem hier eine Ablösung statt-
gefunden und so ein continuirliches Fortlaufen der Randlinie
ermöglicht hat. Anstatt des Berührungspunktes sieht man
eine flache Leiste von ca. 1 ctm. Länge ausstrahlend
und mit zwei divergirenden Schenkeln in deren Substanz
verlaufend. Die Breite dieses verschmolzenen Paares beträgt
3,0 ctm., die Breite von einem Endpunkte zu jener Falte je
1,7 ctm.; die zugehörigen sinus Valsalvae sind also so

schmal, dass ihre Innenfläche längs gerunzelt erscheinen muss und von geringer Tiefe. Die Arteria coronaria dextra geht dicht vor dem hintern Ansatzpunkte des Rudimentes der rechten Klappe ab, die linke Coronararterie etwa in der Mitte des linken Rudiments. Die hintere Aortenklappe spannt sich über einen sehr stark ausgehöhlten, dem ersten Daumengliede Eintritt gestattenden sinus Valsalvae. Der Abstand vom linken zum rechten Ansatzpunkte = 3,2 ctm., ist stark concav und bleibt von der obern Grenze des sinus Valsalvae ca. 1,4 ctm. entfernt. Die Klappe ist durchaus dünn und zart, eher dünner als normal, der Nodulus fast ganz verstrichen, asymmetrisch, indem er etwas nach rechts hinübergerückt ist. An der Berührungsstelle von hinterer und rechter Klappe findet man eine breite Communication über die sich das Klappengewebe brückenartig hinspannt. Obgleich die hintere Klappe in allen Dimensionen ganz übermässig zugenommen hat, steht sie doch in offenbarem Missverhältniss zu ihrem sinus Valsalvae, der sich nach hinten und oben leicht aneurysmatisch hervordrängt und so vom Pericardialsack sowie von der medianen Fläche des linken Atrium aus als deutliche Vordrängung unterschieden werden kann. Das macht den Eindruck, als ob die Vergrösserung der Klappe mit dem Wachsthum des Gefässumfanges trotz dem nicht gleichen Schritt habe halten können. An der linken und rechten Klappe bemerkt man grauröthliche, rüffartige Erhebungen, die aber eine glatte und glänzende Oberfläche besitzen und mit dem Grunde innig verbunden sind. Die Aorta ascendens hat eine Weite von 6,5 ctm.; ihre Wand zunächst unverändert; etwas vor dem Uebergang in den Arcus finden sich grauweisse, der Unterlage fest anhaftende Auflagerungen mit glatter Oberfläche. Weiterhin

gen mehrere gallertig knorpelige Verdickungen, auf denen
 theils körnige, theils membranartige Auflagerungen von röth-
 licher Farbe sitzen. Diese Veränderung setzt sich auch auf den
 Anfangstheil der Arteria anonyma, carotis sinistra und sub-
 clavia sinistra fort. Bei Verfolgung des Arcus entdeckt
 man, dass die Aorta in der Höhe des Isthmus blind endigt. Es
 schiebt sich nämlich zwischen diesen obern Theil und die
 Aorta thoracica ein $\frac{1}{2}$ ctm. hohes, halsartiges Stück, welches
 ganz solide ist und in das nur von oben her eine kleine
 Strecke weit ein blind endigender Centralcanal vordringt,
 der die feinste Sonde unpassirbar. Der oberhalb dieser Ver-
 engung gelegene blinde, sackartige Abschnitt ist mit lockeren,
 brauröthlichen Gerinnseln gefüllt. Diese sind bereits entfärbt
 und enden centralwärts flockig kolbig in einer solchen Linie,
 dass die Passage zwischen Arcus und Subclavia sinistra nur
 wenig behindert ist. Die geschilderte halsartige Einschnürung
 und Atresie liegt dicht unterhalb des Ansatzes des Ductus
 Botalli, der einen dünnen, ganz soliden Strang von ganz
 dem gewöhnlichen Aussehen darstellt. Auch an der ent-
 sprechenden Stelle der Arteria pulmonalis kann man nur
 eine leicht runzlige Narbe, keine sonstige Abnormität finden.
 Dem Ansatz des Ductus arteriosus Botalli entsprechend zeigt
 die Aortenintima eine leichte runzlige Einziehung. Oberhalb
 der obliterirten Stelle misst die Aorta 1—2 ctm., unterhalb
 des Isthmus 5,5 ctm. und ist an seiner hintern Wandung
 nächst dem Abgange der Intercostalarterien leicht verdickt,
 und etwas fleckig, sonst aber hier wie im weitern Verlauf ganz
 normal. Die grossen Brust- und Halsgefässe sind nach Ka-
 liber und Wandbeschaffenheit normal, dagegen die kleineren
 aus der Arteria subclavia entspringenden Stämme, vor allem
 die Arteriae intercostalis suprema, transversa colli und

transversa scapulae und ganz hervorragend die Arteriae mammae internae abnorm erweitert und die Wand verdickt. Letztere sind beiderseits ganz gleichmässig auf Bleistiftdicke erweitert und verlaufen stark geschlängelt ganz an Aneurysma cirroides erinnernd zu dem Rippenbogen hin. Die Venae mammae internae liegen als dünne Gefässe dicht neben den vielfach gewundenen und theils dünnen theils sackig ausgebuchteten Arteriae. Die Arteriae gastricae inferiores zeigen dasselbe Verhalten, wenngleich nicht ganz soweit sind. Die Verbindungen zwischen beiden Gefässgebieten sind äusserst mannigfaltig und werden durch stark geschlängelte, prall mit dunkler Blute gefüllte Bahnen vermittelt, die die Bauchmuskulatur in der Gegend der Herzgrube in dichten Gewirren durchsetzen. In ähnlicher Weise übermässig erweitert und stark geschlängelt sind Arteriae intercostales, besonders die obersten; vor allen Arteriae intercostales tertiae stellen kleine Bleistiftdicke, einmal auf der rechten Seite stark gewundene Arterien dar, unter der Pleura, sie leicht hügelig vorwölbbend, zunächst trüchtlich aufwärts ziehen, um sich dann in die Muskelsubstanz des dritten Intercostalraums einzusenken. Nächste der Wirbelsäule sind sie soweit, dass sie die Intercostalmuskeln durch aus verdrängen und ein tief ausgegrabenes, fast das ganze Intervall zwischen je zwei Rippen einnehmendes Strombett bilden. An diese Aneurysma cirroides ähnliche Stämme schliesst sich weiterhin ein Convolut kleinerer, stark gewundener Gefässe an, die sich im Grossen und Ganzen ebenfalls am untern Rippenrand halten aber auch von einer Seite zur andern über den Knochen hinwegziehend sich wechselseitig die Hand reichen. Die geschilderten Veränderungen der Intercostalarterien nehmen, je weiter nach abwärts, desto

mehr ab. Die Iliacae communes sind ziemlich dünn, jedenfalls im Vergleich zu den Arteriae Iliacae externae, die erheblich dicker erscheinen. Die Arteriae crurales sind von mittlerer Weite; ihre Wandung zeigt deutlich quergestreiftes, fast gerunzeltes Aussehen ohne wesentliche Niveauunterschiede und mit Erhaltung voller Elasticität.

Schädel verhältnissmässig dick, Diploë von mittlerer Breite, allgemein blutreich. Dura mater mässig gespannt, links mehr als rechts. Pia mater durchweg zart und glänzend, Gefässe mässig gefüllt, Gewebe leicht oedematös. Zu beiden Seiten der grossen Längsfalte leicht milchige Trübung. Beim Versuch, die Pia mater abzulösen, stösst man in der rechten Grosshirnhemisphäre in der hintern Centralwindung und von dort nach hinten auf einzelne schmalere Windungen, welche weicher und eingesunken sind. Färbung nicht wesentlich abweichend. Bei der Untersuchung der Gefässe in der Basis zeigt sich in der rechten Arteria carotis ein grauröthliches, der medianen Wand fest anhaftendes Gerinnsel, welches den Eingang in die Arteria corporis callosi verchiessst und sich parietal noch eine Strecke weit central und peripher fortsetzt. Auf dem Durchschnitt hat dasselbe halbmondförmige Gestalt mit pfropfartiger Fortsetzung in den Anfangstheil der Arteria corporis callosi hinein. Der weitere Verlauf der Arteria corporis callosi vor der Arteria communicans anterior ist frei, diese selbst, sowie die Arteria corporis callosi weiterhin ebenfalls; ferner findet sich im Verlauf der Arteria fossae Sylvii die Bahn frei bis kurz vor ihrer Theilung in ihre vier Aeste. Hier sieht man einen linsengrossen, graugelblichen Körper, der eine seitliche Ausbuchtung des Hauptstammes darstellt, gefüllt mit festweicher Gerinnselmasse. Diese hängt zusammen mit einer dicht vor der

Theilung beginnenden, grauröthlichen, sehr derben Gerinnsmasse, die sich jetzt in alle vier Aeste eine kurze Strecke aber so vollständig fortsetzt, dass das Lumen am Anfang dieser Zweige vollständig verstopft ist. Die Gefässwand ist an keiner der genannten Stellen verändert, das Lumen weder enger noch weiter, ausgenommen jenen kleinen weissgelblichen Sack. Links sieht man den Stamm der Arteria carotis frei, nur an der Abgangsstelle der Arteria communicans posterior zeigt sich eine der Wand dicht anliegende das Lumen des Aestchens ganz verstopfende, grauröthliche Gerinnsmasse; auch hier sind die Gefässe sonst ganz frei. Die Arteria corporis callosi und Arteria communicans anterior sind durchaus wegsam, ebenso die Arteria communicans posterior. Bei Anlegung eines sagittalen, den lateralen Rand des Unterecklappens treffenden Schnittes sieht man eine ganze Reihe weicher Stellen; die auffallendste und grösste betrifft die Gyri der rechten hintern Centralwindung, die in eine graugelbe, etwas breiige Masse aufgelöst ist; nirgends in der Peripherie grössere Schwellung und Röthung, lediglich Substanzverluste. Ausserdem sieht man durch die ganze Markmasse zerstreut eine grosse Zahl von etwas eingesunkenen schmutzig weissen bis graugelben, etwas undeutlich begrenzten Herden; auch hier fehlt jede Spur von Blutung, fast jede Schwellung und Röthung der Markmasse. Die Inselwindung ist durch etwas stärkere Röthung ausgezeichnet, die besonders stark auf der angrenzenden rechten Schläfenwindung ausgeprägt ist. Hier sind auch einzelne Gefässe verstopft. Graue Substanz auf dem Durchschnitt feuchter und glänzender. Auf der linken Seite treten in der weissen Markmasse zahlreiche ähnliche, wenn auch kleinere Herde entgegen. Hier sind Inselwindungen frei: auch die Röthung fehlt, und ebenso lassen

sich an den Gyri der Oberfläche keine gröberen Herde nachweisen; nur hier und da ist die Pia mater stärker adhaerent, das äusserste Gyrusgewebe auch hier schmutzig graugelb und weich. Die Ventrikel von normaler Weite, Ependym durchweg glatt; an den grossen Ganglien der Basis anscheinend keine Herderkrankungen.

Lungen normal bis auf mässige Hypostase und Oedem der untern Abschnitte.

Halsorgane frei.

Abdomen frei. Dünndarm- und Dickdarmschlingen stark ausgedehnt, colon transversum am stärksten, aber auch flexura sigmoidea stark aufgetrieben.

Milz mittelgross, von normaler Beschaffenheit.

Nieren etwas blutreicher; in der linken Niere ein kleiner, etwas prominenter, röthlich gelber Herd, der auf dem Durchschnitt als keilförmiger, etwas in die Tiefe greifender sich ausweist.

Leber etwas blutreicher. — Darm frei.

Anatomische Diagnose: Encephalomalacia quinque hebdomadum disseminata ex embolia reiterata et progrediente arteriae carotidis (et corporis callosi) dextrae et arteriae fossae Sylvii dextrae. Aneurysma sacciforme (embolicum) partis ultimae trunci arteriae fossae Sylvii dextrae. Embolia arteriae carotidis sinistrae (arteriae communicantis posterioris). Malacia gyri postcentralis dextri, centri semi-ovalis utriusque, gyri primi lobi temporalis dextri et gyri frontalis tertii partialis. Endocarditis sanata aortica (Syn-echia et retractio valvulae dextrae et sinistrae, dilatatio posterioris et sinus Valsalvae eiusdem). Atresia aortae thoracicae cum thrombose parietali in parte superiore. Endarteriitis sclerotica aortae ascendentis et arcus. Dilatatio

diffusa (aneurysma cirsoides) et hypertrophia arteriae mammariae internae et epigastricae inferioris utriusque et arteriarum intercostalium. Infarctus recens renis sinistri. Cyanosis renis et hepatis. Hypostasis et oedema pulmonum utriusque.

Es handelt sich also bei K. um einen typischen Fall von Obliteration der Aorta thoracica unterhalb der Insertionsstelle des Ductus arteriosus Botalli. Der Collateralkreislauf wurde in der gewöhnlichen, oben geschilderten Weise gebildet und ist als ein höchst vollkommener zu bezeichnen. Dem anatomischen Befunde entsprechend waren intra vitam irgend welche Beschwerden seitens des Circulationsapparates nicht vorhanden. K. war ein leidenschaftlicher Tänzer; er konnte dem Vergnügen des Tanzes ungestraft nachgehen. Im Jahre 1875 wurde K. Soldat und diente fast 20 Monate bei einem Grenadierregiment. Erst in dieser Zeit genügte der Collateralkreislauf nicht mehr den an ihn gestellten Anforderungen. Bei Anstrengungen (Marschübungen) traten leicht Herzklopfen und Athemnoth ein. Die Untersuchung* constatirte normale Herzdämpfung, deutlichen Spitzenstoss im fünften Intercostalraum mit gleichzeitiger Hebung des vierten, fühlbare und sichtbare Pulsation des zweiten und dritten linken Intercostalraums, sehr energische Pulsation der Carotiden. Der erste Herzton war durch ein hauchendes und schlürfendes Geräusch, das am deutlichsten an der Herzspitze zu hören war und die Pause zwischen erstem und zweitem Herzton ausfüllte, verdeckt. Der Puls war regelmässig und mässig voll. Aus dem Militäirdienst entlassen fand K. nach einiger Zeit Beschäftigung bei einer

* Herr Oberstabs- und Chefarzt Dr. Lentze in Danzig hatte die Güte mir das Resultat der damaligen Untersuchung mitzutheilen,

Eisenbahn. Trotz äusserst anstrengenden Dienstes traten keine Beschwerden bei K. auf. Zuletzt war K., wie schon erwähnt, in einer Zuckerfabrik beschäftigt. Todesursache war Embolie der linken Arteria fossae Sylvii und der linken Arteria carotis und eine kurz vor dem Exitus letalis hinzutretene Embolie der rechten Arteria communicans posterior und theilweise auch der rechten Carotis.

Zu erwähnen wäre noch, dass auch bei K., wie in vielen anderen Fällen, der Collateralkreislauf links besser ausgebildet war als rechts. Ich mache ferner auf die eigenthümliche Verbildung der Aortenklappen aufmerksam. Kriegk und Sommerbrodt haben in ihren Fällen je einen ganz ähnlichen Klappenfehler zu verzeichnen; er unterscheidet sich von dem vorliegenden nur dadurch, dass die dritte Klappe zur Herstellung des Klappenschlusses nicht in gleicher Weise hyperplastisch war. Ebenso sind in dem Falle von Barker (Med. chir. Transact. 43, p. 131) esgl. Schmidts Jahrbücher der in- u. ausländischen Medicin Jahrg. 1861.) und 4 mal in den 40 von Peakok gesammelten Fällen die Zahl der Aortenklappen als nicht vollzählig angegeben. Die Entstehung dieser Anomalie ist in dieselbe Lebensperiode und auf dieselbe Ursache zurückzuführen, welche der Veränderung der Aortenintima zu Grunde liegen.

Es bleibt schliesslich noch übrig, Einiges über die Diagnose der Stenose und Obliteration der Aorta nachzutragen. Dieselbe gründet sich vorzugsweise auf den Nachweis der collateralen Circulation. Am Rücken, wo unter normalen Verhältnissen keine Pulsation gefühlt oder gesehen wird; bemerkt man stark pulsirende, subcutan gelegene und verschiebbare, regenwurmartige Packete von

Arterien, die besonders dem Ramus descendens aus der Arteria transversa colli, der circumflexa scapulae und thoracica dorsalis aus der Arteria subscapularis und der Arteria thoracica longa angehören. Ferner sieht oder fühlt man wenigstens Pulsationen der Arteria mammaria interna längs des Sternalrandes und der Arteriae intercostales im Verlaufe der Intercostalräume. Allerdings giebt es eine ganze Anzahl von Fällen, in welchen trotz der aufmerksamsten Untersuchung nichts Derartiges entdeckt wurde. Ein anderes für die Diagnose wichtiges Moment ist das Fehlen des Pulses in der Arteria cruralis; aber auch hier ist in einigen sogar intra vitam diagnosticirten Fällen ausdrücklich angegeben, dass der Cruralpuls, freilich bedeutend abgeschwächt, vorhanden war. Hamernjk (l. c. p. 84) meint, dass es sich in den letztgenannten Fällen nur um eine Stenose der Aorta im Gegensatz zur Obliteration oder um eine nur „dünne elastische“ Scheidewand zwischen Aortenbogen und Aorta descendens handelt, sodass sich die Pulswelle aus dem Aortenbogen unmittelbar in die Aorta descendens fortpflanzt. In diesen Fällen sei der Puls in der Arteria cruralis auch synchron mit dem in der Arteria radialis. Freilich sucht Scheele (Berliner klin. Wochenschr. 1870. Bd. 7) experimentell den Nachweis zu führen, dass auch bei blosser Stenose der Aorta die Pulswelle in der Cruralarterie verspätet zu kommen müsse. Hamernjk hat das von ihm angegebene differential-diagnostische Symptom benutzt, um in einem spätern Falle die Specialdiagnose auf Stenose der Aorta zu stellen. Die Section hat nachträglich die Richtigkeit seiner Diagnose bestätigt. — Als drittes diagnostisches Merkmal wird ein am Thorax hörbares, dem Placentar- oder Blasebalggeräusch verglichesenes Geräusch angegeben.

überdauert den systolischen Herzton, „schleppt ihm etwas nach“, und ist an den Rändern des Sternum in der Höhe der zweiten Rippe am deutlichsten zu hören. Es entsteht nicht am Herzen, sondern in den Arteriae mammae internae. Ein gleiches, aber weniger lautes Geräusch hört man zuweilen zu beiden Seiten der Brustwirbelsäule in der Gegend des Abganges der zweiten Rippe, herrührend von den Intercostalarterien. An den genannten Arterien fühlt man bei dem Aufsetzen des Fingers ein dem Geräusche entsprechendes Schwirren. In dem von Scheele (l. c.) mitgetheilten Falle war auch ein diastolisches Geräusch an denselben Stellen des Thorax, am lautesten auf dem Sternum in der Höhe der zweiten Rippe zu hören. Leyden führte dieses Geräusch nicht auf Insufficienz der Aortenklappen, sondern auf die Blutbewegung in den Intercostalarterien zurück. In unserem Falle, bei dem das gleiche Geräusch zu hören war, wurden die Aortenklappen bei der Section schlussendlich gefunden. In dem Scheele (Leyden)schen Falle fand Section nicht statt. — Die übrigen noch angeführten Erscheinungen haben für die Diagnose einen untergeordneten Werth, so die verstärkte Pulsation der Carotiden, sichtbare Pulsation der Arteriae subclaviae, Zunahme der Herzdämpfung und Feststellung einer Erweiterung der Aorta ascendens.

Nach den angeführten Symptomen scheint die Diagnose nicht leicht zu sein, doch sie scheint es eben nur. Was zunächst den nicht fühlbaren oder sehr schwachen, verspäteten Carotidpuls als diagnostisches Merkmal betrifft, so hat der untersuchende Arzt a priori keine Veranlassung sich von einer Beschaffenheit zu überzeugen, es sei denn, dass ein Aneurysma der Aorta in Frage steht. Ich mache ferner darauf aufmerksam, dass auch das als drittes von mir an-

geführte diagnostische Moment in der Art seines Auftretens ein höchst inconstantes ist. In einer grossen Anzahl gut beobachteter Fälle ist das in den erweiterten collateralen Gefässbahnen entstehende Geräusch am deutlichsten nicht an den als characteristisch bezeichneten Stellen des Thorax gehört worden, sondern irgend wo anders, wo es zu einer falschen Deutung des Geräusches verleiten musste. In unserem Falle ebenso in dem Sommerbrodt'schen Falle ist als sicher anzunehmen, dass das Blasebalggeräusch am Thorax zur Zeit der Einstellung des Patienten in den Militärdienst nicht gehört war. Bei der Entlassung K.'s vom Militair war das Geräusch als ein systolisches am deutlichsten an der Herzspitze zu hören, 7 Jahre später ist bei K.'s Aufnahme auf die medicinische Klinik ein systolisches und diastolisches Geräusch zu hören, am lautesten am obern Theile des Brustbeinkörpers und an der Tricuspidalklappe. Einige Tage später sind alle Geräusche verschwunden. Das einzige Symptom, das sofort auf die Diagnose führen muss, ist die fühl- und sichtbare Pulsation der erweiterten Arterien am Rücken. Aber schon Kries macht darauf aufmerksam, dass ein mässig stark entwickelter Panniculus adiposus dieses Symptom übersehen lassen kann. Ferner ist überhaupt nicht anzunehmen, dass dieses Symptom wirklich immer so deutlich ausgeprägt ist, als es in den intra vitam diagnosticirten Fällen beschrieben wird, wäre sonst geradezu sonderbar, dass, den Sommerbrodt'schen Fall ausgenommen, in keinem einzigen der erst bei der Operation diagnosticirten Fälle von Stenose und Obliteration der Aorta, Pulsation der Arterien am Rücken beobachtet worden ist. Bei K. ist weder bei der Einstellung in den Militärdienst, noch bei seiner Aufnahme ins Militärlazareth

noch bei der Untersuchung behufs Entlassung, noch bei der so häufig vorgenommenen, selbst Geringes und Unbedeutendes nicht übersehenden Untersuchung auf der medicinischen Klinik dieses Symptom bemerkt worden. Nur bei der Untersuchung im Militairlazareth ist von fühl- und sichtbarer Pulsation des zweiten und dritten Intercostalraums die Rede. Bei der damals enorm starken Herzaction mit Hebung des vierten Intercostalraums lag es eben nur zu nahe, auch die Pulsation im zweiten und dritten Intercostalraum auf die Herzaction zurückzuführen. Bei der einige Tage später erfolgten Untersuchung behufs Entlassung vom Militairdienst war diese Pulsation gar nicht mehr vorhanden. Ich komme daher zu dem Schlusse, dass die Nichtbeobachtung der Pulsation der erweiterten Arterien, besonders am Rücken, nur in den seltensten Fällen die Folge einer mangelhaften Untersuchung ist. In unserem Falle ist eine solche absolut ausgeschlossen. Erwägt man schliesslich, dass die Patienten mit Aortenstenose meist wegen eines secundären oder vielleicht wegen eines von jener Anomalie ganz unabhängigen Leidens die Hilfe des Arztes in Anspruch nehmen, so wird es einleuchten, weshalb eine so grosse Anzahl von Stenosen und Obliterationen der Aorta von dem unbefangenen herantretenden Diagnostiker nicht erkannt wird.

Kriegk (l. c.) führt in seinem zweiten, einen Professor betreffenden Fall als bemerkenswerth an, „dass eine Anzahl seiner nächsten männlichen Angehörigen ebenso ganz plötzlich unter Symptomen gestorben sind, welche auf plötzlich eingetretene Vorgänge in der Herzgegend hindeuten; eine Section wurde jedoch bei keinem derselben vorgenommen.“ Nach Kriegk giebt Sommerbrodt (l. c.) der Vermuthung der Heredität der Stenose und Obliteration der

Aorta Raum gegenüber der Angabe seines Patienten, „daß sein Vater vor seinem Tode lange herumgesessen und herumgelegen habe, während ein Bruder mit 17 Jahren an grossem Herzen, die übrigen Geschwister aber in frühester Jugend gestorben seien.“ Bei unserem Patienten ist eine Anamnese nach dieser Richtung hin nicht erhoben worden. Durch einen Bruder desselben erhielt ich nachträglich einige Daten, welche eine auffallende Belastung der Familie mit Herzfehlern erkennen lassen. Die Grosseltern mütterlicherseits starben beide an Apoplexie, die Mutter starb am Herzschlag, ein von mir untersuchter Bruder hat eine Insuffizienz der Aortenklappen, zwei seiner Kinder im Alter von 6¹/₂ und 8 Jahren haben eine Insuffizienz der Mitralis; da es mir nicht möglich war, sämtliche Geschwister unseres Patienten zu untersuchen, erlaube ich mir über die Erblichkeit der Stenose und Obliteration der Aorta kein Urtheil und halte die Fragenach der Heredität für eine offene

Lebenslauf.

Verfasser, geboren zu Loslau O/S. am 15. October 1862, Sohn des dortigen Kaufmanns Josef Manneberg, besuchte das Gymnasium zu Ratibor, welches er im April 1879 mit dem Zeugniss der Reife verliess. Im Mai desselben Jahres wurde er bei der juristischen Facultät der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Berlin immatriculirt, am 6. November 1879 bei der medicinischen Facultät hiesiger Universität. Am 14. December 1881 bestand er daselbst das Tentamen physicum, im Prüfungsjahre 1883/84 die medicinische Staatsprüfung und am 15. März 1884 das Examen rigorosum.

Während seiner Studienzeit besuchte Verfasser die Vorlesungen und Kliniken folgender Herren Professoren und Docenten:

Berger, Berner, Biermer, Born, Buchwald, F. Cohn, H. Cohn, Fischer, Foerster, Fritsch, Gabriel, Gottstein, Grützner, Haeser, Hasse, Heidenhain, Hirt, Kroner, Locwig, Meyer, Neisser, Neumann, Ponfick, Rosenbach.

Allen diesen Herren spricht Verfasser hiermit seinen aufrichtigen Dank aus.

Thesen.

1. Die Stenose und Obliteration der Aorta in der Gegend der Insertion des Ductus arteriosus Botalli kommt beim weiblichen Geschlecht nur scheinbar weniger häufig vor als beim männlichen.
 2. Die Fütterung von Geisteskranken vermittels eines durch die Nase eingeführten weichen Gummischlauches ist nicht ohne Bedenken.
 3. Lupus ist eine tuberculöse Affection.
-